

Les parties I, II et III sont indépendantes.

NOTATIONS. Pour une suite réelle $(u_k)_{k \geq 1}$ la notation $\sup_{k \geq 1} u_k$ désigne $+\infty$ si la suite (u_k) n'est pas majorée et la borne supérieure de $\{u_k; k \geq 1\}$ si cette suite est majorée. Pour deux entiers naturels $p \leq q$, on note $\llbracket p, q \rrbracket$ l'ensemble des entiers supérieurs ou égaux à p et inférieurs ou égaux à q .

On note \mathbb{N} l'ensemble des entiers naturels, \mathbb{N}^* l'ensemble des entiers naturels non nuls, \mathbb{R} l'ensemble des nombres réels.

PARTIE I : Théorèmes de Baire et de Banach-Steinhaus.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel sur \mathbb{R} normé complet. On notera $B(x, r)$ [resp. $\overline{B}(x, r)$] la boule ouverte [resp. fermée] de centre x et de rayon $r > 0$.

On considère une suite $(O_n)_{n \geq 1}$ d'ouverts de E telle que, pour tout $n \geq 1$, l'adhérence \overline{O}_n de O_n est égale à E (ainsi O_n est dense dans E).

1.a) Soit G un ouvert non vide de E . Montrer que l'on peut trouver une suite décroissante de boules $(B(x_n, \varepsilon_n))_{n \geq 1}$, c'est à dire

$$B(x_1, \varepsilon_1) \supset B(x_2, \varepsilon_2) \supset \cdots \supset B(x_n, \varepsilon_n) \supset \cdots$$

avec, pour tout $n \geq 1$,

$$0 < \varepsilon_n < \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad \overline{B}(x_n, \varepsilon_n) \subset G \cap \bigcap_{i=1}^n O_i.$$

1.b) Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ est de Cauchy.

1.c) Montrer que

$$G \cap \bigcap_{i=1}^{+\infty} O_i \neq \emptyset.$$

1.d) Conclure que

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{+\infty} O_i} = E.$$

- 2) On considère une suite $(L_k)_{k \geq 1}$ de formes linéaires continues sur E .
On note $\|L\|$ la norme d'une forme linéaire continue L , c'est-à-dire

$$\|L\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |L(x)|.$$

Pour tout $n \geq 1$, on note

$$V_n = \left\{ x \in E; \sup_{k \geq 1} |L_k(x)| > n \right\}$$

et

$$\Omega = \bigcap_{n=1}^{+\infty} V_n.$$

- 2.a) Pour tout $n \geq 1$, montrer que V_n est un ouvert de E .
2.b) Montrer que Ω est dense dans E si et seulement si pour tout $n \geq 1$, V_n est dense dans E .
2.c) Prouver que si Φ est une forme linéaire sur E qui reste bornée sur une boule de rayon $\rho > 0$ et de centre z quelconque alors Φ est continue et donner une majoration de sa norme.
2.d) On suppose que Ω n'est pas dense dans E . Montrer alors qu'il existe un réel M tel que pour tout $k \geq 1$, $\|L_k\| \leq M$. Que vaut Ω dans ce cas ?

PARTIE II : Permutation des termes d'une série.

- 1) Soit σ une bijection de \mathbb{N}^* sur \mathbb{N}^* et $\sum v_n$ une série réelle absolument convergente. Montrer que la série $\sum v_{\sigma(n)}$ converge.
2) Soit $\sum w_n$ une série réelle convergente telle que $\sum |w_n|$ diverge.
2.a) Pour x réel on note $x^+ = \sup \{x, 0\}$ et $x^- = \sup \{-x, 0\}$. Exprimer x et $|x|$ en fonction de x^+ et x^- .
2.b) Quelles sont les natures des séries $\sum w_n^+$ et $\sum w_n^-$?
2.c) Montrer que l'on peut construire une bijection σ de \mathbb{N}^* sur \mathbb{N}^* et deux applications strictement croissantes φ et ψ de \mathbb{N}^* dans \mathbb{N}^* telles que, pour tout $n \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^{\varphi(n)} w_{\sigma(i)} \geq 1 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^{\psi(n)} w_{\sigma(i)} \leq -1.$$

On proposera un algorithme permettant de proche en proche la détermination des valeurs de σ et la construction de φ et de ψ .

- 2.d) Que peut-on en déduire sur la nature de la série $\sum w_{\sigma(n)}$?
3) Dans cette question $(F, \|\cdot\|_F)$ désigne un espace vectoriel normé sur \mathbb{R} de dimension finie et $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de F . Montrer que $\sum u_{\sigma(n)}$ converge pour toute bijection σ de \mathbb{N}^* sur \mathbb{N}^* si et seulement si la série $\sum \|u_n\|_F$ converge.

- 4) On suppose dans cette question que F désigne l'espace l^2 des suites réelles $v = (v(k))_{k \geq 1}$ telles que $\sum v(k)^2$ converge, muni de la norme

$$\|v\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{+\infty} v(k)^2 \right)^{1/2}.$$

On pose, pour tous $n, k \in \mathbb{N}^*$,

$$\omega_n(k) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq k \\ \frac{1}{n} & \text{si } k = n \end{cases}$$

- 4.a) Montrer que, pour toute bijection σ de \mathbb{N}^* sur \mathbb{N}^* , la série $\sum \omega_{\sigma(n)}$ converge dans F .
- 4.b) Quelle est la nature de la série $\sum \|\omega_n\|_2$? Ceci est-il en contradiction avec le résultat de la question 3)?

PARTIE III : Espaces et opérateurs.

On suppose dorénavant que E désigne l'espace vectoriel des suites réelles $u = (u_k)_{k \geq 1}$ telles que $\sum u_k$ converge.

- 1) Montrer que la formule

$$\|u\| = \sup_{k \geq 1} \left| \sum_{i=1}^k u_i \right|$$

définit une norme sur E .

- 2) On désigne par C l'espace vectoriel des suites réelles $v = (v_k)_{k \geq 1}$ convergentes, muni de la norme $\|v\|_\infty = \sup_{k \geq 1} |v_k|$.
- 2.a) Montrer que C est complet.
- 2.b) Construire une application linéaire continue de $(E, \|\cdot\|)$ sur $(C, \|\cdot\|_\infty)$ bijective et de réciproque continue.
- 2.c) L'espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ est-il complet?
- 3) Soit σ une bijection de \mathbb{N}^* sur \mathbb{N}^* et $N \in \mathbb{N}^*$. On définit une forme linéaire sur E en posant

$$L(u) = \sum_{i=1}^N u_{\sigma(i)}.$$

- 3.a) On suppose que $1 \in \{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(N)\}$. On pose alors

$$\{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(N)\} = \llbracket 1, k'_1 \rrbracket \cup \llbracket k_2, k'_2 \rrbracket \cup \dots \cup \llbracket k_p, k'_p \rrbracket$$

avec $p \in \mathbb{N}^*$ et $1 \leq k'_1 < k_2 - 1 < k_2 \leq k'_2 < \dots < k_p - 1 < k_p \leq k'_p$.

Montrer que L est continue et calculer sa norme

$$\|L\| = \sup_{\|u\| \leq 1} |L(u)|$$

en fonction de p .

3.b) Comment le résultat précédent est-il modifié lorsque $1 \notin \{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(N)\}$?

Dans la partie suivante on notera $p = p_N^\sigma$ pour rappeler que p dépend de σ et de N .

PARTIE IV : Synthèse.

Cette partie utilise les résultats et les notations des parties I et III. En particulier la notation E désigne l'espace défini dans la partie III.

On cherche une caractérisation des bijections σ de \mathbb{N}^* sur \mathbb{N}^* vérifiant la propriété

$$(\mathcal{P}) : \forall (u_n)_{n \geq 1} \in E, \quad (u_{\sigma(n)})_{n \geq 1} \in E$$

1) En utilisant les formes linéaires

$$L_N : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ u = (u_k)_{k \geq 1} \mapsto \sum_{i=1}^N u_{\sigma(i)} \end{cases}$$

donner une condition nécessaire portant sur la suite $(p_N^\sigma)_{N \geq 1}$ (définie dans la partie III) pour que la bijection σ vérifie (\mathcal{P}) .

2) Cette condition est-elle suffisante ?